

Siklos[®]

hydroxycarbamid

mod SEGLCELLE- SYGDOM

Patientvejledning

Siklos[®] 100 mg

Filmovertrukne tabletter
hydroxycarbamid



Siklos[®] 1000 mg

Filmovertrukne tabletter
hydroxycarbamid



**Vigtig information om din
eller dit barns behandling**

Opbevar denne vejledning et sikkert sted,
da du måske ønsker at læse den igen.

1 | Din læge har ordineret Siklos®

Din læge har ordineret Siklos® til dig for at behandle den lidelse du har, kaldet seglcellesygdom. Dette er en arvelig sygdom som påvirker de røde blodlegemer. I løbet af denne sygdom bliver nogen celler unormale, stive og tager form som en halvmåne eller seglform, hvilket fører til anæmi (tab af røde blodceller). Disse seglceller sætter sig også fast i blodkarrene og blokerer blodgennemstrømningen. Dette kan forårsage akutte smertekriser og organskader, som kræver hospitalsindlæggelse.

Siklos® reducerer antallet af smertefulde kriser og antallet af sygdoms-relaterede hospitalsindlæggelser.

Siklos® kan anvendes til voksne, unge og børn ældre end to år.

Siklos® er blevet ordineret til dig. Giv det aldrig til nogen andre, selvom han eller hun har samme lidelse, som den du bliver behandlet for.

Tag denne medicin nøjagtigt som den er ordineret til dig af din læge. Tag din behandling regelmæssigt og skift ikke selv dosis af Siklos®.

Siklos® kan interagere med anden medicin. Fortæl det til din læge, hvis du tager eller har taget anden medicin for nylig, selv om det er medicin, der fås uden recept.

Inden behandlingen påbegyndes henvises der til indlægssedlen, der findes på <http://www.siklos.eu/da>. (Indlægssedlen findes også i hver Siklos® pakning)

BEMÆRK VENLIGST

Siklos® (hydroxycarbamid) er tilgængelig i to forskellige styrker: 100 mg og 1000 mg. Din læge kan ordinere den ene eller begge styrker i løbet af din behandling for at opnå den bedst mulige justering af den daglige dosis.




Siklos® 100 mg

Råhvid aflang form, filmovertrukne tabletter med en delekærv på begge sider.

Hver tabletdel er præget med "H" for Hundrede på den ene side.

Hver tablet indeholder **100 mg hydroxycarbamid og kan deles i to lige store dele på 50 mg.**

Siklos® 100 mg findes i en plastbeholder, der indeholder **60 tabletter**.



Gylden pakning



Siklos® 1000 mg

Råhvid, kapselformede filmovertrukne tabletter med tre delekærve på begge sider.

Hver fjerdedel af tabletten er præget med "T" for Tusinde på den ene side.

Hver tablet indeholder **1000 mg hydroxycarbamid og kan deles i fire lige store dele på 250 mg.**

Siklos® 1000 mg findes i en plastbeholder, der indeholder **30 tabletter**.



Rød pakning

Som en del af din behandling kan din læge ordinere både Siklos® 100 mg tabletter og Siklos® 1000 mg tabletter, der skal tages hver dag. Sørg for, at du forstår den ordinerede dosis og kender forskellen mellem de to tabletstyrker Siklos® 100 mg og Siklos® 1000 mg. Din læge vil fortælle dig, hvor meget Siklos® du skal tage hver dag og vil beskrive doseringen i hele, halve eller kvarte tabletter. Spørg din læge eller på apoteket, hvis du har nogen spørgsmål.

DOSERINGSKORT

Din læge har givet dig dette "Doseringskort" for bedre at forklare, hvilken type af tablet du skal tage hver dag. Du kan vise dette kort på apoteket for at være sikker på, at du får den rigtige ordinerede daglige dosis.

Dato:/...../.....

Yderligere forklaring på recepten for:

Efternavn Fornavn

Vægt kg

Lægen har ordineret mg Siklos® per dag.

Dette betyder, at du hver dag skal tage:


Siklos® 100 mg

Hver tablethalvdel er præget med "H" for Hundrede på den ene side

1/2 tablet: **50 mg**



.... hel(e) tablet(ter) på **100 mg** = mg



Gylden pakning

Siklos® 1000 mg

Hver kvarte tablet er præget med "T" for Tusinde på den ene side

1/4 tablet: **250 mg**



1/2 tablet: **500 mg**



3/4 tablet: **750 mg**



.... hel(e) tablet(ter) på **1000 mg** = mg



Rød pakning

Vis dette kort på apoteket sammen med recepten.

Før du begynder behandlingen, beder vi dig om at læse patientvejledningen. Den indeholder vigtig information om Siklos®, specielt om forholdsregler for håndtering af tabletterne.

2 Siklos® tabletter skal håndteres med forsigtighed

VIGTIG

Siklos® er et cytostoksisk lægemiddel (det har specifikke toksiske virkninger på visse celler) og skal håndteres med forsigtighed.

Siklos® skal opbevares utilgængeligt for børn. Gravide kvinder bør undgå at håndtere Siklos® tabletter. **Siklos® skal tages hver dag på samme tidspunkt, helst om morgenen før morgenmad. Slug tabletten med et glas vand, uden at sutte eller tygge den.**

Vask dine hænder før og efter håndtering af tabletterne.



Sådan deles Siklos® 1000 mg eller Siklos® 100 mg tabletter

Siklos® 1000 mg og Siklos® 100 mg tablet brydes let langs delekærven, hvor hver ende holdes mellem fingrene.


Hvis den ordinerede dosis kræver at tabletten brydes, må det ikke gøres i nærheden af mad.



Pulver, der spildes fra den brudte tablet, skal tørres op med en fugtig engangsklud, som efterfølgende kasseres, for at undgå at andre mennesker indtager pulveret.

Når tabletten er brudt, skal du undgå at røre ved den brudte overflade.

Læg ubrugte tabletdele tilbage i beholderen svarende til den korrekte styrke (dvs. 100 mg præget med H (hundrede) eller 1000 mg præget med T (tusinde)), og læg beholderen tilbage i pakningen.



Smid engangskluden med tabletpartikler (hvis der er nogen) til affald og vask hænderne efter håndtering af tabletterne.

Hvis af du ikke kan synke Siklos® 1000 mg eller Siklos® 100 mg tabletter

Du kan opløse dem i vand på følgende måde umiddelbart før du tager dem:



Læg den ordinerede mængde tabletter eller tabletdele i en teske med lidt vand (hele Siklos® 1000 mg tabletter skal helst være brudt).

Du kan tilsætte en dråbe sirup eller blande indholdet med mad for at skjule en eventuel bitter smag.

Slug indholdet af skeen, så snart tabletten er opløst.

Drik derefter et stort glas vand eller anden væske.

3 Fertilitet – graviditet & amning

Hvis du er kvinde i den fødedygtige alder

Risikoen for fostermisdannelser kan ikke udelukkes, hvis du er gravid under behandling med Siklos®. Derfor anbefales kraftigt en **passende prævention** under behandlingen.

Hvis du ønsker at få børn, bedes du diskutere dette med din læge for at afgøre, om du skal fortsætte behandlingen med Siklos®. Fortæl din læge hvis du bliver gravid, eller tror du kan være gravid, mens du fortsat tager Siklos®.

Den aktive substans af Siklos® overføres til modermælken. Du må ikke amme, imens du tager Siklos®.

Hvis du er en mand

Det er vigtigt for dig at vide, at Siklos® kan have en effekt på sædproduktionen, mens du bliver behandlet og derfor på din evne til at få børn. Dette bør du diskutere med din læge, inden du påbegynder behandlingen med Siklos®.

Til slut, hvis din partner bliver gravid eller planlægger at blive gravid, må du diskutere dette med din læge.

4 Rapportering af bivirkninger med Siklos®

Som enhver anden medicin kan Siklos® forårsage bivirkninger hos nogle mennesker. Læs indlægssedlen grundigt inden du begynder at tage medicinen. Indlægsseddel kan findes på følgende websted: <http://www.siklos.eu/da>.

Kontakt din læge, apoteket eller sygeplejerske, hvis du får bivirkninger. Dette inkluderer også mulige bivirkninger, der ikke er nævnt i indlægssedlen.

Du kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at rapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

**For yderligere information, kontakt:
Theravia
Tlf.: 80 20 03 55
E-mail: question@theravia.com**

