

B. FULJETT TA' TAGHRIF

Fuljett ta' tagħrif: informazzjoni għall-utent

**Siklos 100 mg pilloli miksijab’rita
Siklos 1 000 mg, pilloli miksija b’rita**
Hydroxycarbamide

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tieħu din il-mediċina peress li fih informazzjoni importanti għalik.

- Żomm dan il-fuljett. Jista' jkollok bżonn terġa' taqrah.
- Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib, jew lill-ispizjar jew lill-infermier tiegħek.
- Din il-mediċina ġiet mogħtija lilek biss. M'għandekx tghaddiha lil persuni oħra. Tista' tagħmlilhom il-ħsara anki jekk ikollhom l-istess sinjali ta' mard bħal tiegħek.
- Jekk ikollok xi effett sekondarju kellem lit-tabib, jew lill-ispizjar jew l-infermier tiegħek. Dan jinkludi xi effett sekondarju possibbli li m'huwiex elenkat f'dan il-fuljett. Ara sezzjoni 4.

F'dan il-fuljett:

1. X'inhu Siklos u għalxiex jintuża
2. X'għandek tkun taf qabel ma tieħu Siklos
3. Kif għandek tieħu Siklos
4. Effetti sekondarji possibbli
5. Kif taħżeen Siklos
6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

1. X'inhu Siklos u għalxiex jintuża

Siklos jintuża biex jimpedixxi križi ta' wǵigh, inkluż uġiġi fis-sider f'daqqa, ikkawżat mis-sindrome taċ-ċelluli tas-sickle, fl-adulti, adoloxxenti u tfal akbar minn sentejn.

Il-marda taċ-ċelluli tal-minġel hi marda tad-demm li tintiret li taffettwa č-ċelluli tondi ħomor tad-demm.

Xi ċelluli ma jibqghux normali, u jsiru ibsin u jsiru b'forma ta' qamar felli jew minġel, u dan iwassal għal anemja.

Iċ-ċelluli tal-minġel jistgħu wkoll jeħlu fil-vini jew arterji u jimblukkaw il-fluss tad-demm. Dan jista' jikkawża kriżijiet ta' wǵigh akut u ħsara fl-organi.

Għall-kriżijiet ta' wǵigh severi, il-biċċa l-kbira tal-pazjenti jkollhom bżonn li jiddahħlu l-isptar. Siklos inaqqsas in-numru ta' kriżijiet b'uġiġi, kif ukoll il-bżonn li wieħed jinżamm l-isptar, b'konnessjoni mal-marda.

Is-sustanza attiva ta' Siklos, hydroxycarbamide, hi sustanza li tinibixxi l-iżvilupp u l-proliferazzjoni ta' xi ċelluli , bħaċ-ċelluli tad-demm. Dawn l-effetti jwasslu għal tnaqqis ta' ċelluli ħomor, bojod u ċelluli tad-demm li jikkoagħulaw fiċ-ċirkolazzjoni (effett majelosoppressiv). Fil-marda taċ-ċelluli tal-minġel, hydroxycarbamide jgħin ukoll biex jippreveni č-ċelluli ħomor tad-demm milli jieħdu forma mhux normali.

2. X'għandek tkun taf qabel ma tieħu Siklos

Tiħux Siklos

- Jekk inti allergiku għal hydroxycarbamide jew xi sustanzi oħra ta' din il-mediċina , (imniżżla fis-sezzjoni 6),

- jekk tbat minn mard tal-fwied serju,
- jekk tbat minn mard tal-kliewi serju,
- jekk inti majelosoppressat (i.e. jekk għandek produzzjoni mnaqqsa ta' ċelluli ħomor, bojod jew ċelluli tad-demm li jikkoagulaw) kif deskrirt f'sezzjoni 3 “Kif għandek tieħu Siklos, “Visti ta’ wara l-kura” ,
- jekk qed tredda’ (ara sezzjoni “Tqala u treddiġi u fertilità”).

Twissijiet u prekawzjonijiet

Kellem lit-tabib jew l-ispiżjar jew l-infermier tiegħek qabel tieħu Siklos

- jekk għandek mard tal-fwied,
- jekk għandek mard tal-kliewi,
- jekk għandek ulċeri fis-saqajn,
- jekk qed tieħu prodotti medicinali majelosoppressivi oħra (inaqqsu l-produzzjoni ta' ċelluli ħomor, bojod jew ċelluli tad-demm li jikkoagulaw) jew qed tirċievi terapija bir-radjazzjoni,
- jekk għandek nuqqas magħruf tal-vitamina B₁₂ jew tal-folate.

Jekk ikollok esperjenza (jew kellek esperjenza) ta' xi wieħed/waħda minn dawn, jekk jogħġgbok għid lit-tabib tiegħek. Jekk għandek xi mistoqsijiet jekk jogħġgbok staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar jew l-infermier tiegħek.

Pazjenti u/jew ġenituri jew il-persuna legalment responsabbi jridu jkunu jistgħu jsegwu l-istruzzjonijiet dwar l-għoti ta' dan il-prodott medicinali, u s-sorveljanza u l-kura tagħhom.

Medicini oħra u Siklos

Għid lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek jekk qed tieħu, ħadt dan l-aħħar jew tista' tieħu xi medicina oħra.

Qsim tal-informazzjoni hija specjalment meħtieġa għal

- xi medicini antiretrovirali (dawk li jinibixxu jew jeqirdu retrovirus bħal HIV), eż. didanosine, stavudine u indinavir (jista' jseħħi tnaqqis fl-ghadd ta' ċelluli bojod tiegħek),
- medicini majelosoppressivi (inaqqsu l-produzzjoni ta' ċelluli ħomor, bojod jew ċelluli tad-demm li jikkoagulaw) u terapija ta' radjazzjoni,
- xi tilqim,
- monitor kontinwu tal-glukozju (CGM), użat biex jittestja l-glukozju fid-demm tiegħek (hydroxycarbamide jista' jgħolli b'mod falz ir-riżultati tal-glukozju tas-sensor minn certi sistemi ta' CGM u jista' jwassal għal ipogliċemija jekk ir-riżultati tal-glukozju tas-sensor jintużaw bħala baži għad-doża tal-insulina).

Tqala u treddiġi u fertilità

Jekk inti tqila jew qed tredda’, taħseb li tista tkun tqila jew qed tippjana li jkollok tarbija, itlob il-pari tat-tabib jew tal-ispiżjar tiegħek qabel tieħu din il-medicina.

Siklos mhux rakkmandat waqt it-tqala. Jekk jogħġgbok ikkuntattja lit-tabib tiegħek jekk minnufiha taħseb li inti tqila. L-użu ta' kontraċċejji effettiva hu rakkmandat ħafna.

Jekk toħroġ tqila jew qed tippjana li toħroġ tqila waqt li qed tieħu Siklos, tabib tiegħek se jiddiskuti miegħek il-benefiċċi u r-riskji potenzjali jekk tkompli tużu Siklos.

Għal pazjenti rġiel li qed jieħdu Siklos, jekk is-sieħba tiegħek toħroġ tqila jew qed tippjana li toħroġ tqila, it-tabib tiegħek se jiddiskuti miegħek il-benefiċċi u r-riskji possibbli jekk tkompli tużu Siklos.

Is-sustanza attiva ta' Siklos tgħaddi fil-ħalib tas-sider tal-bniedem. M'għandekx tredda’ waqt li qed tieħu Siklos.

Hydroxycarbamide jista' jnaqqas il-produzzjoni isperma f'pazjenti r̄giel waqt li jkunu qed jiġu kkurati.

Sewqan u thaddim ta' magni

Xi persuni jista' jkollhom esperjenza ta' sturdament meta jużaw Siklos. Issuqx u tużax ġħodda jew magni jekk ikollok sturdament meta tieħu Siklos.

3. Kif għandek tieħu Siklos

Dejjem għandek tieħu din il-mediċina skont il-parir tat-tabib tiegħek. Iċċekkja mat-tabib jew spiżjar tiegħek jekk ikollok xi dubju.

Doża

It-tabib tiegħek se jghidlek kemm tieħu Siklos kuljum u se jiddesrivi d-doża f'pilloli shah, nofsijiet u kwartijiet.

Id-doża preskrikka ta' Siklos għandha tittieħed darba kuljum, preferibbilment filgħodu qabel il-kolazzjon.

Tista' tittieħed ma' tazza ilma jew ma' ammont żgħir ħafna ta' ikel.

Jekk ma tkunx tista' tibla' l-pilloli, tista' thollhom fl-ilma **imeddatament qabel ma tużahom:**

- Poġġi d-doża meħtieġa (preferibbilment imfarrka jekk tintuża pillola Siklos 1 000 mg) f'kuċċarina u žid ffit ilma.
- Hekk kif il-pillola tinħall, ibla' l-kontenut tal-kuċċarina. Tista' żżid qatra ta' ġulepp jew thallat il-kontenut mal-ikel biex ittaffxi xi ffit it-togħma morra li jista' jkun hemm.
- Imbagħad ixrob tazza kbira bl-ilma jew jew kwalunkwe xarba oħra.

Immaniġġjar

Siklos hu mediċina čitotossika li għandha tiġi mmaniġġjata b'attenzjoni.

Kull persuna, speċjalment nisa tqal, li mhux qed jieħdu Siklos għandhom jevitaw li jiġu f'kuntatt dirett mal-biċċiet tal-pillola meta jkun qed jaqsmuha. Aħsel idejk qabel u wara li tmiss il-pilloli.

F'każ li d-doża preskritta tesīġi li l-pillola tinqasam f'nofsijiet jew f'erba' biċċiet, dan għandu jsir 'il bogħod mill-ikel. Trab imixerred mill-pillola maqsuma għandu jintmesah b'xugaman tal-karta niedi li wara jintrema. Għall-ħażna ta' pilloli maqsuma mhux użati, ara sezzjoni 5 "Kif Taħżeen Siklos".

Visti ta' wara l-kura

It-tabib tiegħek ser jgħidlek kemm għandek iddum tieħu Siklos.

Waqt li tkun qed tieħu Siklos se jkollok eżamijiet tad-demm regolari u ttestjar tal-fwied u tal-kliewi. Skont id-doža għalli tieħu, dawn l-eżamijiet jistgħu jsiru kull xahar jew kull xahrejn.

It-tabib tiegħek ser jaġġusta d-doža tiegħek ta' Siklos skont dawn ir-riżultati.

Jekk tieħu Siklos aktar milli suppost

Jekk tieħu Siklos aktar milli suppost jew xi tifel jew tifla ħadu Siklos, kellem lit-tabib tiegħek jew l-eqreb sptar immeddatament, għax jista' jkun li jkollok bżonn kura medika urgjenzi. L-aktar sintomi komuni ta' doża eċċessiva ta' Siklos huma:

- Hmura tal-ġilda,
- Uġiġħ (uġiġħ fil-post li tmiss) u nefha tal-kefef tal-idejn u tal-qiegħ tas-saqajn segwit mill-formazzjoni ta' qoxra fl-idejn u fis-saqajn,
- Pigmentazzjoni (bidliet lokali fil-kulur) qawwija tal-ġilda,
- Uġiġħ jew nefha fil-ħalq.

Jekk tinsa tieħu Siklos

Tieħux doža doppja biex tpatti għall-pillola li tkun insejt tieħu. Kompli bħas-soltu meta jmissek id-doža ta' wara hekk kif tak ir-riċetta t-tabib tiegħek.

Jekk tieqaf tieħu Siklos

Twaqqafx il-kura tiegħek sakemm mhux bil-parir tat-tabib tiegħek.

Jekk għandek aktar mistoqsijiet dwar l-użu ta' dan il-prodott, staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

4. Effetti sekondarji possibbi

Bħal kull mediciċina oħra, din il-mediciċina tista' tikkawża effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux f'kulħadd.

Għid lit-tabib tiegħek immedjatament jekk tinduna b'xi wieħed minn dawn l-effetti sekondarji serji li ġejjin:

- Infezzjoni serja ħafna,
- Għejja u/jew tidher pallidu/a,
- Tbenġil bla spjegazzjoni (akkumulazzjoni ta' demm taħt il-ġilda) jew fsad ta' demm,
- Uġiġħ ta' ras mhux tas-soltu,
- Allucinazzjonijiet,
- Aċċessjonijiet,
- Diffikultà biex tieħu n-nifs.

Għid lit-tabib tiegħek malajr kemm jista' jkun jekk tinnota xi wieħed minn dawn l-effetti sekondarji li ġejjin:

- Deni jew tkexkix ta' bard,
- Thossok marid, jew thossok ma' tiflaħx b'mod ġenerali,
- Raxx (il-ġilda tħimmar, bil-ponot u bil-ħakk),
- Ulċeri jew feriti f'saqajk,
- Ferita (infezzjoni tal-ġilda miftuħha) fil-ġilda tiegħek,
- Diżorjentament (konfużjoni) u sturdament.

DET TAL-JI TA' EFFETTI SEKONDARJI

Effetti sekondarji komuni ħafna (jistgħu jaffettwaw iktar minn persuna 1 minn kull 10) :

Għadd ta' ċelluli tad-demm baxx (majelosopprezzjoni), tkabbir fid-daqs taċ-ċelluli l-ħomor tad-demm, Nuqqas jew ammont baxx ta' spermatozoon fis-semen (ażospermja jew oligospermja). Għalhekk, Siklos jista' jnaqqas l-abilità ta' l-irġiel li jkollhom it-tfal

Effetti sekondarji komuni (jistgħu jaffettwaw sa persuna 1 minn kull 10) :

Tnaqqis fl-ġħadd ta' ċelluli ħomor tad-demm (anemija), għadd baxx ta' plejtlits, ugiġi ta' ras, reazzjonijiet tal-ġilda, infjammazzjoni jew ulċeri fil-ħalq (mukosite orali).

Effetti sekondarji mhux komuni (jistgħu jaffettwaw sa persuna 1 minn kull 100) :

Sturdament, dardir, il-ġilda ssir b'ponot ħomor u bil-ħakk (raxx), dwiefer suwed (melanonikja), jaqa' x-xagħar.

Effetti sekondarji rari (jistgħu jaffettwaw sa persuna 1 minn kull 1 000) :

Feriti fis-saqajn (ulċeri tas-saqajn), funzjoni mibdula tal-fwied.

Effetti sekondarji rari ħafna (jistgħu jaffettwaw sa persuna 1 minn kull 10 000) jew ta' frekwenza mhux magħrufa :

Inf jammazzjoni tal-ġilda li tikkawża tbajja' ħomor bil-qoxra u possibilment flimkien ma' ugiġi fil-għoggi.

Kažijiet iżolati ta' marda malinna taċ-ċelluli tad-demm (lewkimja), kanċer tal-ġilda f'pazjenti anzjani, fsad ta'demm, disturbi gastrointestinali, rimettar, ġilda xotta, deni, nuqqas taċ-ċiklu mestrwali (amenorreja), u żieda fil-piż.

Rappurtar tal-effetti sekondarji

Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellem lit-tabib jew, lill-ispiżjar jew l-infermier tiegħek. Dan jinkludi xi effett sekondarju li mhuwiex elenkat f'dan il-fuljett.

Tista' wkoll tirrapporta effetti sekondarji direttament permezz tas-sistema ta' rappurtar nazzjonali mniżżla f'Appendici V. Billi tirrapporta l-effetti sekondarji tista' tgħin biex tiġi pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta' din il-mediċina.

5. Kif taħżeen Siklos

Żomm din il-mediċina fejn ma tidhirx u ma tintlaħhaqx mit-tfal.

Tużax Siklos wara d-data ta' skadenza li tidher fuq il-flixkun u l-kartuna wara JIS.

Aħżeen f'temperatura taħt 30°C.

Pilloli maqsumin mhux użati għandhom jitpoġġew lura fil-flixkun u għandhom jintużaw fi żmien tliet xħur.

Tarmix mediċini mal-ilma tad-dranaġġ jew mal-iskart domestiku. Staqsi lill-ispiżjar tiegħek dwar kif għandek tarmi mediċini li m'għadekx tuża. Dawn il-miżuri jgħinu għall-protezzjoni tal-ambjent.

6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

X'fih Siklos

- Is-sustanza attiva hi hydroxycarbamide.
Kull pillola mikṣija b'rita ta' Siklos 100 mg fiha 100 mg hydroxycarbamide.
Kull pillola mikṣija b'rita ta' Siklos 1 000 mg fiha 1 000 mg ta' hydroxycarbamide.

- Is-sustanzi l-oħra huma sodium stearyl fumarate, silicified microcrystalline cellulose u basic butylated methacrylate copolymer.

Kif jidher Siklos u l-kontenuti tal-pakkett:

Siklos 100 mg pilloli mikṣija b'ritahuma ta' lewn off-white, f'għamlu oblonga b'ferq fuq iż-żewġ naħat. Il-pillola tista' tinqasam f'żewġ partijiet ugħwali.

Kull nofs pillola hu intaljat b''H" fuq naħha waħda.

Siklos 100 mg hu formut fi fliexken tal-plastik li jkun fihom 60, 90 jew 120 pilolla.

Siklos 1 000 mg pilloli mikṣija b'rita huma ta' lewn off-white, b'forma ta' kapsula, b'ferq triplu fuq iż-żewġ naħat. Il-pillola tista' tinqasam f'erba' partijiet indaq.

Kull kwart tal-pillola għandu intaljat "T" fuq naħha waħda.

Siklos 1 000 mg hu fornut fi flixkun li fi 30 pillola.

Jista' jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

Id-Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq

ATHERAVIA

16 Rue Montrosier

92200 Neuilly-sur-Seine

Franza

Manifattur

Delpharm Lille
Parc d'Activités Roubaix-Est
22 rue de Toufflers
CS 50070
59452 Lys-lez-Lannoy
Franza

Għal kull tagħrif dwar din il-mediċina, jekk jogħġibok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali tad-Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq:

België/Belgique/Belgien

THERAVIA
Tél/Tel: +32(0) 2 808 2973

България

THERAVIA
16 Rue Montrosier
92200 Neuilly-sur-Seine – Франция
Tel: +33 (0)1 72 69 01 86

Česká republika

THERAVIA
16 Rue Montrosier
92200 Neuilly-sur-Seine - Francie
Tel: +33 (0)1 72 69 01 86

Danmark

Oresund Pharma ApS
Orient Plads 1
2150 Nordhavn
Danmark
Tlf: +45 53 63 39 16

Deutschland

THERAVIA
Tel: 0800 10 90 001

Eesti

THERAVIA
16 Rue Montrosier
92200 Neuilly-sur-Seine - Prantsusmaa
Tel: +33 (0)1 72 69 01 86

Ελλάδα

DEMO ABEE
Τηλ: +30 210 81 61 802

Lietuva

THERAVIA
16 Rue Montrosier
92200 Neuilly-sur-Seine – Prancūzija
Tel: +33 (0)1 72 69 01 86

Luxembourg/Luxemburg

THERAVIA
Tél/Tel: +352 27 86 23 29

Magyarország

THERAVIA
16 Rue Montrosier
92200 Neuilly-sur-Seine - Franciaország
Tel: +33 (0)1 72 69 01 86

Malta

THERAVIA
16 Rue Montrosier
92200 Neuilly-sur-Seine - Franza
Tel: +33 (0)1 72 69 01 86

Nederland

THERAVIA
Tel: +31 (0) 20 208 216

Norge

Oresund Pharma ApS
Orient Plads 1
2150 Nordhavn
Danmark
Tlf: +45 53 63 39 16

Österreich

THERAVIA
16 Rue Montrosier
92200 Neuilly-sur-Seine - Frankreich
Tel: +33 (0)1 72 69 01 86

España

Abacus Medicine A/S
Tel: +34 910605214

France

THERAVIA
16 Rue Montrosier
92200 Neuilly-sur-Seine
Tel: +33 (0)1 72 69 01 86

Hrvatska

THERAVIA
16 Rue Montrosier
92200 Neuilly-sur-Seine
Tel: +33 (0)1 72 69 01 86

Ireland

THERAVIA
Tel: +353(0)1-903 8043

Ísland

THERAVIA
16 Rue Montrosier
92200 Neuilly-sur-Seine - Frakkland
Sími: +33 (0)1 72 69 01 86

Italia

THERAVIA
Tel: 800 959 161

Κύπρος

The Star Medicines Importers Co Ltd
Τηλ: +357 25 37 1056

Latvija

THERAVIA
16 Rue Montrosier
92200 Neuilly-sur-Seine- Francija
Tel: +33 (0)1 72 69 01 86

Polska

THERAVIA
16 Rue Montrosier
92200 Neuilly-sur-Seine - Francja
Tel: +33 (0)1 72 69 01 86

Portugal

Abacus Medicine A/S
Tel: +34 910605214

România

THERAVIA
16 Rue Montrosier
92200 Neuilly-sur-Seine - Franța
Tel: +33 (0)1 72 69 01 86

Slovenija

THERAVIA
16 Rue Montrosier
92200 Neuilly-sur-Seine - Francija
Tel: +33 (0)1 72 69 01 86

Slovenská republika

THERAVIA
16 Rue Montrosier
92200 Neuilly-sur-Seine - Francúzsko
Tel: +33 (0)1 72 69 01 86

Suomi/Finland

Oresund Pharma ApS
Orient Plads 1
2150 Nordhavn
Tanska
Puh/Tel: +45 53 63 39 16

Sverige

Oresund Pharma ApS
Orient Plads 1
2150 Nordhavn
Danmark
Tel: +45 53 63 39 16

Dan il-fuljett ġie rivedut l-ahħar f' 10/2024

Informazzjoni dettaljata dwar din il-mediċina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini <http://www.ema.europa.eu/>. Hemm ukoll links għal siti elettroniċi oħra dwar mard rari u kura.