

DOSERINGSANVISNING

Din läkare kan ge dig denna ”doseringsanvisning” för att bättre förklara vilka tabletter du måste ta varje dag. Du kan visa denna anvisning till apotekspersonalen för att vara säker på att du får rätt förskrivna dos.

Datum:/...../.....

Ytterligare förklaring om medicinen förskrivna till:

Efternamn Förnamn

Vikt kg

Din läkare har förskrivit mg av Siklos® per dag.

Detta betyder att du varje dag ska ta:

Siklos® 100 mg

Varje tablethalva är märkt med ”H” för Hundra på ena sidan

1/2 tablett: **50 mg**



... hel(a) tablett(er) på **100 mg** = mg



Guldfärgad burk

Siklos® 1000 mg

Varje fjärdedel av tablettens är märkt med ”T” för Tusen på ena sidan

1/4 tablett: **250 mg**



1/2 tablett: **500 mg**



3/4 tablett: **750 mg**



... hel(a) tablett(er) på **1000 mg** = mg



Röd burk

Vänligen visa denna doseringsanvisning för apotekspersonalen när du hämtar ut ditt recept.

Vänligen läs ”behandlingsvägledning för patienter” innan du påbörjar din behandling; den innehåller viktig information om Siklos®, särskilt om försiktighetsåtgärder för hantering av tabletterna.

Informationen tillhandahålls av din läkare eller laddas ner: <https://www.siklos.eu/se>

addmedica

Siklos[®]

hydroxikarbamid

Finns i två olika styrkor:

100 mg och **1000 mg**

Hur man använder Siklos[®] tabletdelar?

Om du behöver en halv eller en fjärdedels tablett, beroende på din ordinerade dos, kan tablettorna lätt delas.

Placera de oanvända, delade tablettorna i motsvarande tablettburk med rätt styrka och sätt sedan tillbaka den i tillhörande ytterförpackning. De delade tablettorna måste användas inom 3 månader.

