

Siklos® hydroksykarbamid

i SIGDCELLESYKDOM
Pasientveiledning

Siklos® 100 mg

Filmdrasjerte tabletter
hydroksykarbamid



Siklos® 1000 mg

Filmdrasjerte tabletter
hydroksykarbamid



Viktig informasjon om din eller barnets behandling

Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du
kan få behov for å lese det igjen.

addmedica

1

Legen din har forskrevet Siklos®

Legen din har forskrevet Siklos® til deg for å behandle tilstanden du har, som kalles sigdcellesykdom. Dette er en arvelig sykdom som rammer de røde blodcellene. Ved denne sykdommen blir noen celler unormale, stive og får en halvmåne- eller sigdform, noe som fører til anemi (tap av røde blodlegemer). Disse sigdcellene setter seg også fast i blodårene og blokkerer blodstrømmen. Dette kan forårsake akutte smertekriser og organeskader som krever sykehusinngang.

Siklos® vil redusere antallet smertefulle kriser og behovet for sykehusinngang i forbindelse med sykdommen.

Siklos® kan brukes til voksne, ungdommer og barn over to år.

Siklos® er forskrevet for deg. Gi den aldri til andre, selv om han eller hun har samme lidelse som du blir behandlet for.

Ta denne medisinen nøyaktig slik den er forskrevet av legen din. Ta behandlingen regelmessig og ikke endre dosen med Siklos® alene.

Siklos® kan interagere med andre legemidler. Informer legen din dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, også reseptfrie.

Før du starter behandlingen, se pakningsvedlegget som du finner på <http://www.siklos.eu/no>.

(Pakningsvedlegget finner du også i hver eske med Siklos®)

NB!

Siklos® (hydroksykarbamid) fås i 2 forskjellige styrker: 100 mg og 1000 mg. Legen din kan forskrive én eller begge styrkene i løpet av behandlingen for å oppnå best mulig justering av den daglige dosen.



Siklos® 100 mg

Off-white, avlange, filmdrasjerte tabletter med 1 delestrek på begge sider.

Hver halve tablet er preget med "H" for Hundre på den ene siden.

Hver tablet inneholder **100 mg hydroksykarbamid og kan deles i to like deler på 50 mg.**

Siklos® 100 mg leveres i en plastflaske som inneholder **60 tabletter.**

Gyllen ytre emballasje



Siklos® 1000 mg

Offwhite, kapselformede filmdrasjerte tabletter med 3 delestreker på begge sider.

Hvert kvarte tablet er preget med "T" for Tusen på den ene siden.

Hver tablet inneholder **1000 mg hydroksykarbamid og kan deles i fire like deler på 250 mg.**

Siklos® 1000 mg leveres i en plastflaske som inneholder **30 tabletter.**

Rød ytre emballasje



Som en del av behandlingen kan legen din forskrive både Siklos® 100 mg-tabletter og Siklos® 1000 mg-tabletter, som skal tas hver dag. Forsikre deg om at du forstår den forskrevne dosen og er klar over forskjellen på de to tablettsyrkene Siklos® 100 mg og Siklos® 1000 mg. Legen vil fortelle deg hvor mye Siklos® du skal ta hver dag og vil si om du skal ta dosen i hele, halve eller kvarte tabletter. Spør legen din eller apoteket dersom du har spørsmål.

DOSERINGSARK

Legen din kan gi deg dette doseringsarket for bedre å forklare hvilken type tabletter du må ta hver dag. Du kan vise dette arket til apoteket for å være sikker på at du får riktig forskrevet daglig dose.

Dato:/...../.....

Ytterligere forklaring til forskrivningen på:

Etternavn Fornavn

Vekt kg

Legen din har forskrevet mg Siklos® per dag.

Dette betyr at du hver dag bør ta:

Siklos® 100 mg

Hver tabletthalvdel er preget med "H" for Hundre på den ene siden

1/2 tablet: 50 mg



... hel(e) tablet(er) på **100 mg** = mg



Siklos® 1000 mg

Hver kvarte tablet er preget med "T" for Tusen på den ene siden

1/4 tablet: 250 mg



1/2 tablet: 500 mg



3/4 tablet: 750 mg



... hel(e) tablet(er) på **1000 mg** = mg



Vis dette arket på apoteket sammen med resepten.

Før du starter behandlingen ber vi deg lese pasientveiledningen. Den inneholder viktig informasjon om Siklos®, spesielt om forholdsregler for håndtering av tabletene.

2

Siklos®-tabletter må behandles med forsiktighet

VIKTIG

Siklos® er en cellegift (det har spesielle giftige virkninger på visse celler) og må behandles med forsiktighet.
Siklos®-bokser må oppbevares utilgjengelig for barn.
Gravide kvinner må unngå å håndtere Siklos®-tabletter.
Siklos® må tas hver dag på samme tid, helst om morgenen før frokost. Svelg tabletten med et glass vann uten å suge eller tygge.



Vask hendene før og etter håndtering av tablette.

Hvordan dele Siklos® 1000 mg eller Siklos® 100 mg-tabletter?

Siklos® 1000 mg og Siklos® 100 mg tablett brekkes lett langs delestrekene hvis du holder hver ende mellom fingrene.
Hvis den forskrevne dosen krever at tabletten deles, må du gjøre det på god avstand fra matvarer.



Pulver som kommer fra den delte tabletten, skal tørkes opp med en fuktig papirserviett som deretter kasseres, for å unngå at andre mennesker får i seg pulveret.

Når tabletten er delt, må du unngå å berøre den brukne overflaten.

Legg tilbake ubrukete tablettdeler i flasken som tilsvarer riktig styrkeform (dvs. 100 mg preget med H (Hundre) eller 1000 mg preget med T (Tusen)), og legg flasken tilbake i esken.



Kast servietten med tablettpartikler (hvis det er noen slike) i søpelet og vask hendene etter håndtering av tabletter.

I tilfelle du ikke kan svelge Siklos® 1000 mg eller Siklos® 100 mg tabletter

Du kan oppløse dem i vann på følgende måte umiddelbart før du tar dem:



Legg den forskrevne mengden tabletter eller tablettdelene i en teskje med litt vann (Siklos® 1000 mg tabletter skal helst knuses).

Du kan tilsette en dråpe fruktsirup eller blande innholdet med mat for å skjule bitter smak.

Svelg innholdet i skjeen så snart tabletten er oppløst.

Drikk deretter et stort glass vann eller annen drikke.

3

Fertilitet – graviditet og amming

Hvis du er en kvinne i fertil alder

Risikoen for fosterabnormaliteter kan ikke utelukkes hvis du er gravid mens du får behandling med Siklos®, så et **egnet prevensjonsmiddel** anbefales på det sterkeste under behandlingen.

Hvis du ønsker å få barn, må du diskutere dette med legen din for å avgjøre om du skal fortsette behandlingen med Siklos®. Informer legen din dersom du blir gravid eller tror du kan være gravid mens du fortsatt bruker Siklos®.

Virkestoffet i Siklos® går over i morsmelk hos mennesker. Du må ikke amme mens du tar Siklos®.

Hvis du er en mann

Det er viktig at du er klar over at Siklos® kan ha en effekt på sædproduksjonen mens du blir behandlet og derfor på din evne til å få barn. Dette punktet bør diskuteres med legen din før du starter behandlingen med Siklos®.

Til slutt, hvis partneren din blir gravid eller planlegger å bli gravid, må du diskutere dette med legen din.

4

Rapportering av bivirkninger med Siklos®

Som alle medisiner kan Siklos® forårsake bivirkninger hos noen mennesker. Les pakningsvedlegget nøyde før du begynner å ta medisinien. Denne brosjyren er tilgjengelig på følgende adresse: <http://www.siklos.eu/no>.

Snakk med lege, apotek eller sykepleier hvis du opplever bivirkninger. Dette innbefatter mulige bivirkninger som ikke er oppført i pakningsvedlegget.

Du kan også rapportere bivirkninger direkte til det nasjonale rapporteringssystemet:

Statens legemiddelverk

Nettside: www.legemiddelverket.no/pasientmelding

Ved å rapportere bivirkninger kan du bidra til mer informasjon om sikkerheten til dette legemidlet.

For mer informasjon, kontakt:

Øresund Pharma ApS

Tlf.: +45 53 63 39 16

E-post: info@oresundpharma.com

