



Um den größtmöglichen Nutzen aus den Wirkungen von Siklos® auf Ihre Gesundheit zu ziehen, die fachgerechte Anwendung zu gewährleisten und unerwünschte Nebenwirkungen zu begrenzen, sind bestimmte Maßnahmen/ Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, die in diesen Unterlagen (RMA Version 10/2025) erläutert werden.

SIKLOS® -DOSIERUNGSANLEITUNG

Ihr Arzt hat Ihnen diese «Dosierungsanleitung» gegeben, worin beschrieben ist, welche Tabletten Sie täglich einnehmen sollen. Sie können dieses Formular Ihrem Apotheker zeigen, damit Sie die tatsächlich verordnete Tagesdosis auch erhalten.

Datum:...../...../.....

Zusätzliche Erklärung zur ärztlichen Verordnung für:

Name:..... Vorname:.....

Gewicht: kg

Ihr Arzt hat Ihnen täglich mg SIKLOS® verordnet.

Die verschriebene Dosis SIKLOS® muss einmal täglich eingenommen werden, vorzugsweise morgens vor dem Frühstück. Das bedeutet, jeden Tag die Einnahme von:

Siklos® 100 mg

Jede halbe Tablette ist auf einer Seite mit einem "H" geprägt ("H" für Hundert)

1/2 Tablette: 50 mg



... ganze Tablette(n) zu 100 mg = mg



Goldene Verpackung

Siklos® 1000 mg

Jede viertel Tablette ist auf einer Seite mit einem "T" geprägt ("T" für Tausend)

1/4 Tablette: 250 mg



1/2 Tablette: 500 mg



3/4 Tablette: 750 mg



... ganze Tablette(n) zu 1000 mg = mg



Rote Verpackung

Bitte legen Sie dieses Formular zusammen mit Ihrem Rezept Ihrem Apotheker vor.

Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Siklos®-Arzneimittel verwenden.

Den vollständigen und aktualisierten Text der Packungsbeilage finden Sie auf der Website www.afmps.be unter der Rubrik «Search information on an authorised medicine».

Informationsbroschüre, die von Ihrem Arzt ausgestellt wurde oder die Sie herunterladen können:

<https://www.siklos.eu/be>




Siklos®

Teilbare Filmtablette

In 2 verschiedenen Dosierungen erhältlich:
100 mg und **1 000 mg**

Wie verwende ich die SIKLOS®-Tablettenstücke von einem Tag auf den anderen?

Falls Sie, je nach ärztlicher Verordnung, **eine halbe oder viertel Tablette benötigen**, können die Tabletten einfach zerteilt werden. Sämtliche Personen, insbesondere Schwangere, die SIKLOS® nicht einnehmen, sollten den direkten Kontakt mit der Tablette in gebrochener Form, vermeiden. Waschen Sie sich vor und nach dem Kontakt mit den Tabletten die Hände. Falls die verordnete Dosis das Zerteilen einer Tablette in Hälften oder Viertel erfordert, sollte dies nicht in der Nähe von Nahrungsmitteln geschehen. Das Pulver, das durch das Zerteilen einer Tablette entsteht, sollte mit einem feuchten Tuch abgewischt und entsorgt werden. Geben Sie die nicht eingenommenen Tablettenstücke zurück in die Flasche und bewahren Sie sie in der Schachtel auf. Die Tablettenstücke müssen innerhalb von 3 Monaten verbraucht werden.



Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das Pflegepersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in der Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt der Föderalagentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte www.afmps.be Abteilung Vigilanz anzeigen. Website: www.notifizierungeffetindesirable.be E-Mail: adr@fagg-afmps.be.

Nebenwirkungen im Zusammenhang mit der Anwendung von Siklos® können der Pharmakovigilanzabteilung von Theravia auch telefonisch gemeldet werden unter +32 (0)2 808 2973 oder per E-Mail an pv@theravia.com

Indem Sie unerwünschte Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.


theravia